

AVERTISSEMENTS AGRICOLES®

BULLETIN TECHNIQUE DE LA STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES RHONE-ALPES

AIN, ARDECHE, DROME, ISERE, LOIRE, RHONE, SAVOIE, HAUTE-SAVOIE

ARBO. VITI. RHONE-ALPES

ABONNEMENT ANNUEL: 110f

REGISSEUR RECETTES D.D.A.F.



RÉGION RHÔNE-ALPES 55, rue Mazenod 69426 LYON CÉDEX 03

07 août 1986

N° de série continue 323

Bulletin n° 14

VIGNE

VERS DE LA GRAPPE : Vols tardifs d'eudémis dans la Loire et le Sud Beaujolais
POURRITURE GRISE : Troisième traitement 10 jours avant véraison
OIDIUM - MILDIOU : Maintenir la protection
CICADELLES - ACARIENS : Surveillez les attaques

VERS DE LA GRAPPE

Situation : Des vols d'eudémis tardifs importants ont eu lieu dans la Loire (Forez et Roannais) et dans le Sud Beaujolais (St Vérand, Sarcey et Bully). Les conditions climatiques étant favorables cette année aux eudémis, les pontes ont été nombreuses sur certaines vignes dans les régions citées précédemment. Un renouvellement de traitement sera parfois nécessaire.

Pour les cochylis, malgré des vols assez importants, les pontes ont été peu nombreuses car les conditions climatiques ont été défavorables. (La cochylis a besoin d'un climat plus humide que l'eudémis).

Préconisations : Contrôlez les attaques de vers de la grappe (surtout dans la Loire et le Sud Beaujolais). Renouvelez le traitement si vous observez 10 % de grappes ayant des perforations (utilisez alors un produit curatif).

POURRITURE GRISE (BOTRYTIS)

Dans les zones sensibles à la pourriture, effectuez un traitement dès que vous observez les premiers grains vérés (cela correspond à 10 jours avant la pleine véraison).

Si vous souhaitez utiliser un produit à base d'imide cyclique*, c'est le moment.

* KIDAN, ROVRAL, SUMISCLEX, RONILAN, RONILAN SP et SILBOS T. N'utilisez qu'une seule fois ce type de produit cette année.

MILDIOU

Maintenez une cadence régulière de traitement dans les vignes présentant quelques taches. Ailleurs vous pouvez espacer les traitements en surveillant bien l'évolution de la vigne.

OIDIUM

Maintenez la protection jusqu'à la véraison.

CICADELLES ET ACARIENS

Surveillez les attaques (rougissement ou jaunissement de feuillage). Observez les parasites sur la face inférieure des feuilles.

Pour les cicadelles, traitez si vous observez 50 larves pour 100 feuilles. (Les produits ont été donnés dans le bulletin précédent, vous pouvez y ajouter l'EKALUX).
Pour les acariens, traitez si 30 % des feuilles portent au moins un acarien.

ARBORICULTURE

CARPOCAPSE ET CAPUA : début des seconds vols
ACARIENS : Quelques attaques importantes
FEU BACTERIEN : Attention, surveillez vos vergers
TORDEUSES ORIENTALES : Maintenez la protection

POMMIERS - POIRIERS

Carpocapse

Situation : fin de la première génération, début du second vol.

Préconisation : les traitements sont à effectuer dans toutes les zones.

Intervention possible jusqu'au 13 août avec un produit ovicide, après cette date, utilisez des larvicides.

Capua

Situation : début du second vol dans certains secteurs (Valence (26), CERCIER (74), CHEVRIERS (74)).

Préconisation : Dans les vergers où les risques sont importants, intervenez, dès à présent, avec les produits suivants :

- Deltaméthrine (DECIS)
 - Méthidathion (ULTRACIDE)
 - méthomyl (LANNATE)
 - phosmet (IMIDAN)
 - Fenpropathrin (DANITOL) : ne pas utiliser en vergers de poiriers.
- Ces produits sont efficaces sur carpocapse.

Psylles du poirier

Situation : le niveau de population est acceptable dans l'ensemble des vergers.

Préconisation : Ne pas intervenir.

Pour le carpocapse utilisez, si possible, le Phosmet (IMIDAN) à cause de son action sur psylle.

ARAIGNEES ROUGES

Situation : des attaques importantes sont observées actuellement dans certains vergers de poiriers.

Préconisation : dans les plantations infestées, intervenez, dès à présent, avec l'un des produits suivants :

- Chinométhionate (MORESTAN) sans délai
- Cyhexatin + Tétradifon (nombreuses spécialités) délai avant récolte : 30 jours
- Dicofol + Tétradifon (KELTHION) délai avant récolte : 15 jours

FEU BACTERIEN

Les conditions climatiques de ce printemps ayant été généralement très favorables au développement du feu bactérien, nous vous demandons d'observer attentivement vos plantations de pommiers et poiriers ainsi que les végétaux d'ornement sensibles à cette maladie (cotoneasters, aubépine, pyracantha).

En cas de dessèchement anormal des pousses et rameaux, veuillez nous alerter dès que possible.

PECHERS

Tordeuses Orientales

Situation : les prises d'adultes aux pièges sexuels demeurent importantes.

Préconisation : maintenez la protection en respectant les délais d'emploi avant récolte.